

Hoja de respuestas correctas de la prueba preliminar/prueba posterior

1. Durante un paro cardíaco, ¿qué le ocurre a la víctima?

- El corazón sigue latiendo y bombeando sangre, y la víctima sigue viva.
- El corazón deja de latir, la víctima no responde ni respira con normalidad.
- El corazón sigue latiendo, la víctima no respira con normalidad y la sangre no circula.
- El corazón sigue latiendo y bombeando sangre, pero la víctima no respira con normalidad.

2. ¿Qué es lo primero que debe hacer al llegar a una escena en que alguien se ha desmayado?

- Golpear suavemente a la víctima y dirigirse a ella en voz alta.
- Llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera).
- Comprobar que la escena sea segura.
- Comprobar la respiración.

3. Durante la RCP usando solo las manos, ¿cuántas compresiones torácicas debe realizar por minuto?

- Aproximadamente 50.
- Entre 100 y 120.
- Entre 130 y 150.
- Entre 150 y 200.

4. ¿Qué profundidad deben tener las compresiones en el pecho de un adulto cuando realiza la RCP usando solo las manos?

- Al menos 2,5 cm (1 pulgada).
- Al menos 5 cm (2 pulgadas).
- Al menos 7,5 cm (3 pulgadas).
- Al menos 10 cm (4 pulgadas).

5. Después de pedir ayuda en voz alta, ¿qué debe hacer para administrar la RCP usando solo las manos?

- Llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera), comprobar la respiración e iniciar las compresiones.
- Iniciar las compresiones, comprobar la respiración, llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera).
- Llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera), iniciar las compresiones y comprobar la respiración.
- Comprobar la respiración, iniciar las compresiones, llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera).

6. ¿Para qué sirve el DEA?

- Lee el ritmo cardíaco y le informa de si es necesaria una descarga.
- Llama automáticamente al 9-1-1 y pide ayuda.
- Le informa de si es necesaria una descarga y le ofrece la frecuencia cardíaca.
- Llama automáticamente al 9-1-1 y le informa de si es necesaria una descarga.

7. ¿Sabe dónde se encuentra el DEA en su escuela?

- Sí.
- No.

8. ¿Se sentiría cómodo realizando RCP usando solo las manos si alguien tuviera un paro cardíaco?

- Sí.
- No.

Preguntas opcionales

9. Un adulto atragantado ha dejado de responder mientras se le realizaban compresiones abdominales. ¿Cuál es el paso que sigue?

- Pedir ayuda.
- Poner a la víctima en el suelo.
- Llamar al 9-1-1 y conseguir un DEA (si lo hubiera).
- Realizar 30 compresiones.

10. ¿Qué debe recordar siempre al realizar la RCP en un niño?

- Los niños necesitan ventilaciones y compresiones.
- La RCP en niños es similar a la RCP en adultos.
- Por niño se entiende a un menor de más de 1 año de edad que no ha alcanzado la adolescencia.
- El corazón de los niños suele estar sano.

11. ¿Cuáles son los signos de atragantamiento en un niño?

- El niño puede hablar y jugar.
- El niño no puede hablar, pero sí puede toser.
- El niño puede toser y reírse.
- El niño no puede toser, hablar ni respirar.

12. Durante la RCP con ventilaciones en adultos, ¿cuántas ventilaciones debe realizar después de cada 30 compresiones?

- 2 ventilaciones.
- 4 ventilaciones.
- 6 ventilaciones.
- 8 ventilaciones.