



## HEARTSAVER®

# DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA EN NIÑOS



1. Reconozca una obstrucción grave de la vía aérea cuando un niño:
  - Realiza el signo de obstrucción
  - No puede respirar, toser, hablar ni emitir sonidos
  - Tiene tos silenciosa
  - Pregunte: "¿te estás atragantando?" Si asiente con la cabeza, dígame que lo va a ayudar.



2. Realice compresiones por encima del ombligo hasta que:
  - el objeto salga
  - el niño pueda respirar o emitir sonidos
  - el niño deje de responder.



3. Si el niño no responde
  - Grite pidiendo ayuda.
  - Utilice un teléfono móvil para llamar al 9-1-1; póngalo en modo altavoz para poder hablar con el operador telefónico mientras inicia la RCP.
  - Repita los ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones, examinando la boca tras cada serie de compresiones por si hay algún objeto dentro (si ve algún objeto, retírelo).
  - Si está solo y no tiene un teléfono móvil, realice 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Luego, llame al 9-1-1 y consiga un DEA. Utilice el DEA en cuanto esté disponible. Siga con la RCP y revise la boca tras cada serie de compresiones por si hay algún objeto dentro.
  - Continúe con la RCP y mirando dentro de la boca después de cada ciclo de compresiones hasta que:
    - el niño se mueva, llore, hable, parpadee o reaccione de algún otro modo,
    - llegue la ayuda médica y asuma el control.

